



SOCIEDAD DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
EN HEMOSTASIS Y TROMBOSIS DEL URUGUAY

<p>CADA FACTOR DE RIESGO 1 PUNTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDAD 40 – 60 a. <input type="checkbox"/> Antecedentes de cirugía mayor reciente. <input type="checkbox"/> Várices de MMII. <input type="checkbox"/> Edemas de MMII. <input type="checkbox"/> Enfermedad inflamatoria intestinal. <input type="checkbox"/> Obesidad, IMC > 30. <input type="checkbox"/> IAM (< 1 mes). <input type="checkbox"/> Insuf. Cardíaca (< 1 mes). <input type="checkbox"/> Sepsis (< 1 mes). <input type="checkbox"/> EPOC. <input type="checkbox"/> I. respiratoria, Neumonía grave. (< 1 mes) <input type="checkbox"/> Inmovilización por férula o yeso. 	<p>SCORE DE RIESGO de ETEV. Caprini modificado. Derechos reservados © Registro en Biblioteca Nacional. N° 154. Montevideo. Uruguay 01/04/2016</p>
	<p>CADA FACTOR DE RIESGO 2 P.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Edad 61 – 74 a. <input type="checkbox"/> Cirugía mayor. (> 1 h). <input type="checkbox"/> Artroscopia (> 1 h). <input type="checkbox"/> Cirugía laparoscópica (> 1h). <input type="checkbox"/> Antecedentes de enf. Maligna. <input type="checkbox"/> VVC. <input type="checkbox"/> Obesidad mórbida.
	<p>CADA FACTOR RIESGO 5 P.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Recambio de cadera o rodilla. <input type="checkbox"/> Fractura cadera o pelvis (< 1 mes) <input type="checkbox"/> Stroke (< 1 mes). * <input type="checkbox"/> Politrauma (< 1 mes). <input type="checkbox"/> Lesión de médula espinal. <input type="checkbox"/> cirugía mayor que dura > 3 hs. <p>*stroke que genera inmovilidad.</p>

<p>CADA FACTOR RIESGO 3 P.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Edad > 75 a. <input type="checkbox"/> Cirugía mayor de 2 - 3 hs. <input type="checkbox"/> Antecedentes de ETEV (enf. tromboembólica venosa). <input type="checkbox"/> Historia fliar de trombosis. TVP, TEP. <input type="checkbox"/> Cáncer activo o PQT. (tipo de cáncer <input type="checkbox"/> Trombofilia congénita o adquirida. <input type="checkbox"/> sind. Postrombótico. <input type="checkbox"/> Obesidad con IMC > 50. 	<p>SOLO EN MUJERES. 1 PUNTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACO anticonceptivos orales o TRH terapia de reemplazo hormonal. <input type="checkbox"/> Embarazo o postparto (< 1 mes). <input type="checkbox"/> Pérdida recurrente de embarazos. <input type="checkbox"/> Restricción del crecimiento intrauterino. (RCIU) <input type="checkbox"/> Decolamiento placentario. <input type="checkbox"/> Síndrome HELLP. <input type="checkbox"/> SAFE (S. antifosfolípido en embarazo).
	<p>SCORE de RIESGO</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin-left: 50px;"></div>